

Признаки употребления ПАВ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ	ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ
<ul style="list-style-type: none"> • Лицо напоминает маску (обвисшие губы, полузакрытые веки) • Появляется бледность или покраснение лица. • Зрачок (крайне важный признак!) в это время необычно узкий и совершенно не расширяется в темноте, поэтому при сумрачном освещении острота зрения заметно снижается, покрасневшие или мутные глаза. • Не может выполнять точные действия, характерно мелкое дрожание пальцев рук. • Хронический кашель. • Плохая координация движений (неуверенная походка, спотыкание, пошатывание при ходьбе, резкие отклонения в сторону от направления движения). • Расстройство ЖКТ. • Повышенная потливость. • Потеря аппетита, похудение, а иногда чрезмерное употребление пищи. • Учащение или урежение пульса, резкие скачки артериального давления. • Зуд кожи лица (особенно кончика носа) и верхней половины туловища (расчесы кожи головы, шеи, за ушами и верхней половины туловища). • Болевая чувствительность снижена, и он может обжечься о сигарету или горячую сковородку, не почувствовав боли. • Многочисленные следы укусов в области локтевых сгибов, на кистях рук, на ногах, стопах, венах шеи. В местах укусов часто наблюдаются нагноения. Чтобы скрыть следы укусов, наркоманы предпочитают не раздеваться при посторонних. 	<ul style="list-style-type: none"> • ЭЙФОРИЯ – это приподнятое, безмятежное настроение. • Настроение неустойчивое и может внезапно сменяться недовольством. • Заторможенность мыслительных и мышечно-мускульных реакций, опаздывание в выполнении команд, оцепенелость, вплоть до полного отключения, отсутствие реагирования на обращения к ним. • Мимика становится ярко выраженной • Речь смазанная, невнятная, замедленная или ускоренная с внезапными остановками, непоследовательная • <i>Излишняя жестикуляция, возможно изменение почерка</i> (учителям следует обратить на это особое внимание) • Равнодушны к своему внешнему облику, выглядят неряшливо, не заботятся о чистоте своего тела и одежды. • Подавленность воли, снижение интеллекта, неспособность сосредоточиться, быстрая утомляемость. • Уходы из дома, прогулки по школе по непонятным причинам. • Избегание общения с людьми, с которыми ранее были близки. • Частое вранье, изворотливость, лживость. • Уход от ответов на прямые вопросы, склонность сочинять небылицы. <p align="center">Очевидные признаки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Следы от укусов (особенно на венах), синяки, порезы. ✓ Бумажные и денежные купюры, свернутые в трубочки ✓ Закопченные ложки, фольга. ✓ Капсулы, пузырьки, жестяные банки. ✓ Пачки лекарств снотворного или успокоительного действия. ✓ Папиросы в пачках из-под сигарет.
<p><u>Когда действие препаратов подходит к концу:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Вялость ⇒ Малоподвижность ⇒ Безразличие к окружающему ⇒ Заторможенность состояния или глубокий сон 	<p align="center">ПОДРОСТКОВЫЙ ПСИХИАТР В КИРОВЕ: 64-93-76 (регистр.)</p>

ПРИЗНАКИ АБСТИНЕНЦИИ («ломки»)	ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ПАВ
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Раздражительность ➤ Капризность ➤ Конфликтность ➤ Безучастность к окружающим людям. ➤ Необъяснимое возбуждение ➤ Тошнота, рвота ➤ Повышенная потливость ➤ Дрожание пальцев рук ➤ Озлобленность ➤ Уход из дома либо звонки по телефону и говорит незаконченными фразами ➤ Плаксивость ➤ Вспыльчивость ➤ Беспричинное чувство страха ➤ Головная боль и боль в суставах ➤ Расстройство сна ➤ Учащенный или разреженный пульс ➤ Расширение или сужение зрачков. <p style="text-align: center;">Более полная информация на стендах и официальном сайте школы.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) вызвать «Скорую помощь»; 2) повернуть больного на бок; 3) очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс; 4) следить за характером дыхания до прибытия врачей; 5) при частоте дыхательных движений меньше 8-10 в минуту произвести искусственное дыхание изо рта в рот.